

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
BBCH 00–14 (od siewu do fazy czterech liści kukurydzy)			
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona	S–metolachlor	Basar Deluge Metallica	1,5 l/ha
bodziszek, chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielona	metolachlor-S + terbutyloazyna	Gardo Gold 500 SC Primextra Gold	4,0 l/ha
BBCH 10–12 (po wschodach do fazy dwóch liści kukurydzy)			
chwasty prosoвате, fiołki, komosa, przytulia, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian, samosiewy rzepaku, szarłat	izoksafutol + tienkarbazon metylu	Adengo 315 SC	0,33–0,44 l/ha
BBCH 10–13 (po wschodach do fazy trzech liści kukurydzy)			
blekot, bniec, bodziszek drobny, fiołki, gorczyca, gwiazdnica, iglica pospolita, komosa, krzywoszyj, mak, maruna, psianka, przetacznik perski, rumian polny, szarłat, tasznik, wyki	mezotrion + S–metolachlor	Camix 560 SE	2,0–2,5 l/ha
fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolity	pendimetalina	Pendigan Strong 400 SC	4,0 l/ha
bodziszek, chaber, chwasty prosoвате i rumianowate, fiołki, jasnoty, komosa, farbownik (krzywoszyj) polny, maki, przytulia, psianka, samosiewy rzepaku, rdesty, szarłat, tasznik, tobołki	mezotrion + S–metolachlor + terbutyloazyna	Lumax 537,5 SE	3,5–4,0 l/ha
BBCH 10–14 (po wschodach do fazy czterech liści kukurydzy)			
chwasty prosoвате	S–metolachlor	Dual Gold 960 EC	1,5 l/ha
blekot, bodziszek, chwastnica jednostronna, fiołki, komosa, maruna, przytulia, psianka, rdesty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, rumian, szarłat	petoksamid	Successor Tx 487,5 SE	4,0 l/ha
blekot pospolity, jasnoty, przetacznik perski, psianka, szarłat, rumian polny	petoksamid	Successor 600 EC Traxor 600 EC	2,0 l/ha
BBCH 11–12 (w fazie od jednego do dwóch liści kukurydzy)			
gorczyca polna, gwiazdnica, jasnota, purpurowa, komosa, mleczyk zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki, włośnica zielona	pendimetalina	Jet-Pendy 330 EC Pendigan 330 EC Yellow Hammer 330 EC	4,0–5,0 l/ha
BBCH 11–13 (po wschodach w fazie od jednego do trzech liści kukurydzy)			
fiołki, komosa, łoboda, tasznik	pendimetalina	Activus 400 SC	4,0 l/ha
chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	flufenacet + terbutyloazyna	Aspect T	2,25 l/ha
BBCH 11–16 (faza od jednego do sześciu liści kukurydzy)			
bieluń, gwiazdnica, koniczyna biała, niezapominajka, przytulia, poziomnik szorstki, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szczawie	fluoksypyr	Starane 333 EC	0,54 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
fioltek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna	sulkotriion + terbutyloazyna	Sulcotrex 500 SC	2,0 l/ha
BBCH 11–17 (faza od jednego do siedmiu liści kukurydzy)			
chwasty prosozate, dymnica, gwiazdnica pospolita, jasnoty, maruna, perz, przytulia, samosiewy rzepaku, szczawie, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	rimsulfuron + adiuwant	Egrecutor 25 SG + Asystent+ Rimel 25 SG + Asystent+ Rincon 25 SG + Asystent+ Mambo 25 WG + Trend 90 EC Ramzes 25 WG + Trend 90 EC Titus 25 WG + Trend 90 EC Twist 25 WG + Trend 90 EC	50–60 g/ha + 0,05–0,1 l/ha
	rimsulfuron + adiuwant	Rim 25 WG + Glyfin	60 g/ha + 0,1%
fioltek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne	tifensulfuron metylowy	Tiff 040 OD	0,27 l/ha
BBCH 11–18 (faza od jednego do ośmiu liści kukurydzy)			
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, rdest ptasi, rdestówka powojowata, chwasty rumianowate, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki polne	mezotriion	Notos 100 S.C. Solis 100 SC	1,5 l/ha
		Border 100 SC	1,0–1,5 l/ha
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, tasznik pospolity	bentazon	Beni	2,0 l/ha
BBCH 12–14 (faza od drugiego do czwartego liścia kukurydzy)			
chwastnica jednostronna, fiołki, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdestówka powojowata, tobołki	nikosulfuron	Mace Nikosh 040 SC Nisha 040 OD Nitya 040 OD	1,25–1,5 l/ha
BBCH 12–15 (faza od drugiego do piątego liścia)			
ambrozja bylicolistna, komosa biała, rdestówka	dikamba	Dicash Dolero	0,6 l/ha
gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa, mak, maruna, przytulia, rdesty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik, tobołki, żółtlica	dikamba + tritosulfuron	Jatagan 75 WG Mocarz 75 WG Nokaut 75 WG Siłacz 75 WG Siłacz Max 75 WG	0,2 kg/ha
BBCH 12–16 (faza od drugiego do szóstego liścia)			
fiołki, komosa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata, szarłat szorstki, tasznik pospolity	terbutyloazyna	Tezosar 500 SC Terbusar 500 SC Terbustar 500 SC	1,0 l/ha
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna	rimsulfuron	Contor 25 WG Plaza 25 WG Radar 25 WG Rimuron 25 WG	50 g/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica, mak, przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, stulicha psia	2,4-D + florasulam	Deresz Bis 306 SE Diablo 306 SE Dresz 306 SE Eguo 306 SE Feniks 306 SE Horse 306 SE King 306 SE Kojot 306 SE Muskato 306 SE Mustang 306 SE Rumak 306 SE Vima-Florasulam	0,6 l/ha
gwiazdnica, niezapominajka, przytulia, poziomnik szorstki, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szczawie	fluroksypyr	Fluxyr Pro Galaper Extra 200 EC Minstrel	1,0 l/ha
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa	florasulam + fluroksypyr	Valentia 102 SE	1,2–1,8 l/ha
		Bachmat 306 SE Matbach 306 SE Zebra 306 SE	0,6 l/ha
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa, chwasty prosowate	florasulam, fluroksypyr + rimsulfuron	Bachmat 306 SE + Titus 25 WG Matbach 306 SE + Titus 25 WG Zebra 306 SE + Titus 25 WG	0,6 l/ha + 30–60 g/h
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szczawiolistny, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa, perz właściwy	(florasulam + fluroksypyr) + (jodosulfuron metylosodowy + foramsulfuron)	Bachmat 306 SE + Maister 310 WG Matbach 306 SE + Maister 310 WG Zebra 306 SE + Maister 310 WG	0,6 l/ha + 100–150 g/ha
bodziszek, chwasty prosowate, fiołki, gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, komosy, poziomniki, przytulia, psianka, rumian, rumianek, szarłat, tasznik, tobołki	jodosulfuron metylosodowy + foramsulfuron + adiuwant	Maister 310 WG + adiuwant Mero 842 EC	0,1–0,15 kg/ha + 1,3–2,0 l/ha
	jodosulfuron metylosodowy + foramsulfuron	Maister 31 OD	1,5 l/ha
chwasznica jednostronna, fiołki, komosa, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity	foramsulfuron + tienkarbazon metylu	Monsoon Active	1,5 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica, mak, przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, stulicha psia, bodziszek, chwasty prosowate, fiołki, gorczyca, jasnoty, komosy, poziewniki, psianka, szarłat, tasznik, tobołki	(2,4-D + florasulam) + (jodosulfuron metylosodowy + foramsulfuron)	Deresz Bis 306 SE + Maister 310 WG Diablo 306 SE + Maister 310 WG Diablo 306 SE + Maister 310 WG Diablo 306 SE + Maister 310 WG Feniks 306 SE + Maister 310 WG Horse 306 SE + Maister 310 WG King 306 SE + Maister 310 WG Kojot 306 SE + Maister 310 WG Muskato 306 SE + Maister 310 WG Mustang 306 SE + Maister 310 WG Rumak 306 SE + Maister 310 WG Vima-Florasulam 2,4 D + Maister 310 WG	0,6 l/ha + 0,1–0,15 kg/ha
chaber, gorczyca, chwasty kapustowate, gwiazdnica pospolita, mak, przytulia, powój, rdesty, rumianowate, samosiewy rzepaku, stulicha psia, chwasty prosowate, dymnica, jasnoty, maruna, perz, szczawie, szarłat szorstki, tasznik pospolity, toboki polne	(2,4-D + florasulam) + (rimsulfuron)	Deresz Bis 306 SE + Titus 25 WG Diablo 306 SE + Titus 25 WG Diablo 306 SE + Titus 25 WG Diablo 306 SE + Titus 25 WG Feniks 306 SE + Titus 25 WG Horse 306 SE + Titus 25 WG King 306 SE + Titus 25 WG Kojot 306 SE + Titus 25 WG Muskato 306 SE + Titus 25 WG Mustang 306 SE + Titus 25 WG Rumak 306 SE + Titus 25 WG Vima-Florasulam 2,4 D + Titus 25 WG	30–60 g/ha + 0,6 l/ha
chwasty prosowate, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, kurzyśląd polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	nikosulfuron	Innovate 240 EC Squash 240 EC	0,2 l/ha
		Novel 240 SC Vectis 240 SC	0,2–0,25 l/ha
chwasty prosowate, chwastnica jednostronna, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, krzywoszyj polny, kurzyśląd polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	(nikosulfuron) + (sulkotrion)	Innovate 240 SC + Shado 300 SC Novel 240 SC + Shado 300 SC Squash 240 SC + Shado 300 SC Vectis 240 SC + Shado 300 SC	0,2 l/ha + 1,0 l/ha
bodziszek, chwastnica jednostronna, komosa biała, perz, rumian, wyki	nikosulfuron + rimsulfuron	Hector Max 66,5 WG + Trend 90 EC	330–440 g/ha + 0,1%
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, rdestówka powojowata, tasznik pospolity	(bentazon)	Benz	2,0 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
BBCH 12–17 (faza od drugiego do siódmego liścia kukurydzy)			
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica, fiołki, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, maruna bezwonna, rdest szczawolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku	nikosulfuron	Cherke 04 SC Daichi 040 SC Fornet 04 SC Henik Extra 040 OD Ikanos 040 OD Ipanema 040 OD Kivi 040 SC Maksymus 040 SC Mentum 040 OD Mezon 040 OD Nicoil 040 SC Nicorn 040 SC Nikosulfuron 040 SC Nisshin 040 SC Nixon Extra 040 OD Pampa 040 SC Samson 040 SC Tamizan 040 OD	1,0 l/ha
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna	nikosulfuron	Ventto 040 OD	1,0 l/ha
fiołki, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, psianka, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szarłat, tasznik, tobołki	(bromoksynil + terbutyloazyna)	Bromoterb 500 SC	1,5–2,0 l/ha
BBCH 12–18 (faza od drugiego do ósmego liścia kukurydzy)			
chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, psianka czarna, rdestówka powojowa, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity	bromoksynil + tembotrion	Auxo 337 EC	1,5 l/ha
chwastnica jednostronna, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, mlecz zwyczajny, rdesty, przytulia, psianka czarna, szarłat, samosiewy rzepaku, tasznik, tobołki, włośnica zielona	tembotrion	Laudis 44 OD	1,7–2,25 l/ha
chwasty prosozawate, owies głuchy, perz zwyczajny, wiechlina roczna, dymnica, fiołki, gwiazdnica, komosa, maruna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka, przytulia, rdest kolankowy i plamisty, rumiany i rumianki, starzec zwyczajny, szarłat, tasznik, tobołki	mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron + adiuwant	Arigo 51 WG + Trend 90 EC Colombus 51 WG + Trend 90 EC	0,33 kg/ha
		Mezonir 340 WG + Asystent+	0,5 kg/ha
blekot, bodziszek drobny, chwastnica, fiołki, farbownik polny, gorczyca, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, maruna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia, psianka, rdest kolankowy, plamisty i ptasi, rdestówka, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, wilczomlecz obrotowy	mezotrion + terbutyloazyna	Calaris 400 SC Clic Premium	1,0–1,5 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
chwasty prosowate, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, kurzyśląd polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	nikosulfuron + adiuwant	Accent 75 WG + Trend 90 EC Victus 75 WG + Trend 90 EC	60–80 g/ha
	nikosulfuron	Templier 750 WG + adiuwant	54 g/ha
		Kornic 060 OD Nikosar 060 OD	0,5–0,7 l/ha
		Climax Extra 6 OD Daichi Extra 6 OD Fornet Extra 6 OD Kivi Extra 6 OD Nisshin Extra 6 OD Pampa Extra 6 OD Samson 6 OD	0,5–0,75 l/ha
		Astral 040 OD Ducel Ikaherb 040 OD Impreza 040 OD Ipanema 040 OD Kelvin 040 OD Victus 040 OD Stretch	1,0 l/ha
		Kelvin 040 SC Victus 040 SC	1,0–1,5 l/ha
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica, jasnota purpurowa, komosa, rdest ptasi, rdestówka powojowata, chwasty rumianowate, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki polne	mezotrion	Ashoka 100 SC Kideka 100 SC Madoka 100 SC	0,5–1,5 l/ha
		Barracuda Cobber 100 SC Cuter Faktor Juzan 100 SC Maisot 100 SC Raikiri 100 SC Daneva 100 SC Mestar 100 SC Simba 100 SC Visigoth 100 SC Wolfram 100 SC	0,75–1,5 l/ha
		MesotriGuard Osorno SC Temsu SC	1,5 l/ha
komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolity	pirydat	Diva 600 EC Elara 600 EC Onyx 600 EC	1,5 l/ha
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kurzyśląd polny, przetaczniki, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne	pirydat + mezotrion	Botiga	1,0 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
dymnica pospolita, fiołki polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosy, maruna nadmorska, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szczawolistny, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tobołki polne, zaśláz pospolity, żótllica drobnokwiatowa	bromoksynil + mezotrion	Grizzly 200 OD Nagano 200 OD Rydwán 200 OD	1,0 l/ha
wrażliwe gatunki wymieniono przy pojedynczych herbicydach	(nikosulfuron) + (rimsulfuron) + adiuwant	Fulcorn 50 SG + Rimel 25 SG + Asystent+ Fulcorn 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+ Henik 50 SG + Rimel 25 SG+ Asystent+ Henik 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+ Nixon 50 SG + Rimel 25 SG+ Asystent+ Nixon 50 SG + Rincon 25 SG+ Asystent+	60–80 g/ha + 30–40 g/ha
bodziszek, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, maruny, przetacznik perski, przytulia, psianka, rdesty, rumian, rumianki, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, żótllica, chwastnica, wiechlina, perz	nikosulfuron + mezotrion + adiuwant	Elpaso 105 OD + Asystent+ Elumis 105 OD + Asystent+ Solux 105 OD + Asystent+	1,0–1,5 l/ha + 0,05%
bniec, bodziszek, fiołki, gwiazdnica, komosa, krzywoszyj, maruna, mak, przytulia, rdestówka, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat, tobołki, tasznik, żótllica	dikamba + prosulfuron + adiuwant	Casper 55 WG + Trend 90 EC	0,3 kg/ha + 0,05–0,1%
chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne	dikamba + nikosulfuron + adiuwant	Kaltor 750 SG + adiuwant	0,25 kg/ha
chaber, chwasty prosoowate, fiołki, jasnota purpurowa, perz, przetacznik perski, rdestówka powojowata	nikosulfuron + rimsulfuron + adiuwant	Hector 53,6 WG + Trend 90 EC Principal 53,6 WG + Trend 90 EC	70–90 g/ha + 0,1%
BBCH 12–19 (faza od drugiego do dziewiątego liścia kukurydzy)			
chwasty prosoowate, owies głuchy, perz właściwy	Cykloksydym + adiuwant	Focus Ultra 100 EC + Dash HC	1,0–4,0 l/ha + 2,0 l/ha
BBCH 13–15 (faza od trzeciego do piątego liścia)			
chaber, chwastnica, dymnica, fiołki, gwiazdnica, jasnoty, komosa, rumianek pospolity, psianka, rdestówka powojowata, rdest kolankowy i plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki	tembotrion + tienkarbazon metylu + adiuwant	Capreno 547 SC + Mero 842 EC	0,22–0,29 l/ha + 2,0 l/ha
BBCH 13–16 (faza od trzeciego do szóstego liścia)			
ambrozja bylicolistna, komosa, rdestówka	dikamba	Oceal 700 SG Vermeil 700 SG	0,4–0,5 kg/ha
chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepaku	2,4-D	Esteron 600 SL	0,8–1,0 l/ha
BBCH 14 (w fazie czterech liści kukurydzy)			
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa, biała, marunna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy, żótllica drobnokwiatowa	(petoksamid) + (sulkotrion)	Traxor 600 EC + Shado 300 SC	1,5 l/ha + 1,0 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
BBCH 14–15 (faza od czwartego do piątego liścia)			
chwastnica, fiołki, jasnota purpurowa, komosa, przytulia, rdestówka powojowata, rumianowate, szarłat, tasznik, tobołki, żóttlica	(mezotrion)	Callisto 100 SC Maran 100 SC 100 SC	1,0–1,5 l/ha
BBCH 14–16 (faza od czwartego do szóstego liścia kukurydzy)			
blekot, bodziszek, chwastnica, fiołki, gwiazdnica, iglica, jasnota purpurowa, komosa, maruna, ostrożeń, perz, poziwchnik, przytulia, psianka, rdesówka, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat, tasznik, tobołki, włośnice	foramsulfuron + jodosulfuron metrylosodowy + tienkarbazon metylu	Maister Power 42,5 OD	1,25–1,5 l/ha
fiołki, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, psianka, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, szarłat, tasznik, tobołki	bromoksynil + terbutyloazyna	Agrikorn 340 SE Cornmax 340 SE Kukugran 340 SE Maizgran 340 SE Zeagran 340 SE Zorba 340 SE	1,6–2,0 l/ha
dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne	bromoksynil + terbutyloazyna	Zorba Duo 340 SE	1,6–2,0 l/ha
chwasty kapustowate, chaber, komosa, psianka, rdest plamisty i powojowy, rumianki, rzodkiew	bromoksynil	Emblem 20 WP	1,5–2,0 kg/ha
		Emblem Pro 385 SC	0,7–1,0 l/ha
		Bromotril 250 SC	1,0–1,3 l/ha
bodziszek, chwastnica, dymnica, fiołki, gwiazdnica, farbownik polny, jasnota purpurowa, komosa, maruna, przytulia, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, rumian polny, szarłat, tasznik, tobołki, włośnice	tembotrion + adiuwant	Laudis 20 WG + Mero 842 EC	0,375–0,5 kg/ha + 2,0 l/ha
bodziszek, chwastnica, fiołki, jasnota purpurowa, komosa, przetaczniki, psianka, przytulia czepna, rdesty, szarłat	sulkotrion	Flesh 300 SC Shado 300 SC Sula Sulcogan 300 SC Sulkorn 300 SC	1,5 l/ha
chwastnica, komosa, psianka, chwasty prosowate, bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, kurzyślak polny, perz właściwy, przytulia czepna, przetacznik perski, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa	sulkotrion + nikosulfuron	Flesh 300 SC + Innovate 240 SC Shado 300 SC + Innovate 240 SC	1,0 l/ha + 0,2 l/ha
chwasty kapustowate, chaber, komosa, psianka, rdest plamisty i powojowy, rumianki, rzodkiew, fiołek polny, wilczomlecz obrotny	(bromoksynil) + (rimsulfuron)	Emblem Pro 385 SC + Titus 25 WG	0,7–1,0 l/ha + 30–60 g/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.

PROGRAM OCHRONY KUKURYDZY

ZWALCZANE CHWASTY	SUBSTANCJA CZYNNNA	NAZWA ŚRODKA	DAWKA
BBCH 14–17 (faza od czwartego do siódmego liścia kukurydzy)			
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata, szarłat, tobołki polne, żółtlca	nikosulfuron	Nicogan 040 OD Nicogran 040 SC	1,0 l/ha
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata, szarłat, tobołki polne, żółtlca, jasnota purpurowa, komosa, przetaczniki, psianka, rdesty	(nikosulfuron) + (sulkotrión)	Nicogran 040 SC + Sulcogan 300 SC	1,0 l/ha + 1,0 l/ha
BBCH 14–19 (faza od czwartego do dziewiątego liścia kukurydzy)			
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołki, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne	nikosulfuron	Bandera 040 OD Narval 040 SC NicoGuard OD Pantani 040 OD Shiver 040 OD Vima-Nikosulfuron	1,0 l/ha
		Nixon 040 OD Samaz Gold 040 OD	1,0–1,5 l/ha
BBCH 15–16 (faza od piątego do szóstego liścia kukurydzy)			
bodziszek, gorczyca polna, komosa, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny	2,4-D	Dicopur 600 SL	0,8–1,0 l/ha